

# هل الخمر في قصة حمل بنات لوط من ابيهم يثبت خطأ التوراه ؟ تكوين 19

Holy\_bible\_1

## الشبهة

- وفيما يختص بواقعة السكر والزنا، يقول الشيخ رحمت الله الهندي في كتابه إظهار الحق ص 306، 5  
2ج 307:

- أ - إن هذه الحادثة لم يسمع بمثلها في الأرذل الذين يكونون مخمورين في أكثر الأوقات لأنهم يميزون في حال الخمر بين بناتهم والأجنبيات
- ب - إنه إذا سقط التمييز بين بناته والأجنبيات لشدة الخمر فلا يبقى السكران في هذا الوقت قابلاً للجماع كما شهد بذلك المولعون بشرب الخمر، وأن مثل هذا الوضع لو وقع لبعض آحاد الناس لضافت عليه الأرض بما رحبت حزناً وغماً فضلاً عن أن يقع هذا النبي الله لوط

## الرد

ورداً على المشكك وشيخه

أ - قد سمع بها كثيراً وفي حالة السكر بالفعل يفقد المخمور تمييزه

ومن عدة مراجع منها الوكيديا وايضاً مرجع

Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein (2005). *Drugs and society*. p. 238. ISBN 9780763737320

Alcohol intoxication is associated with an increased risk that people will become involved in risky sexual behaviours, such as unprotected sex

التسمم بالكحول يصاحبه زيادة في الخطورة ان الناس تدخل في ممارسات جنسية خطيرة مثل الجنس بدون

حمایه

Alcohol is linked to a large proportion of unwanted outcomes associated with sex such as date rape, unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases.

وترجمتها هناك علاقة للكحول ( بالعلاقات الجنسية ) وينتج عنها نتائج غير مطلوبه مثل الاغتصاب والحمل الغير مرغوب به وايضا نقل الامراض

كل هذا بسبب ان الذي يكون مخمور يمارس الجنس دونوعي وقد يصل الحد الى اغتصاب امراة دون ان يدرى

ولتأكيد ذلك ايضا

من كتاب

1. Jones, Barry T.; Jones, Ben C.; Thomas, Andy P.; Piper, Jessica Alcohol consumption increases attractiveness ratings of opposite-sex faces: a possible third route to risky sex *Addiction* 98(8):1069-1075, August 2003
2. Beer goggles", "Cider Visor" and "Stella vision" [14] are slang terms for a phenomenon in which consumption of alcohol lowers sexual inhibitions to the point that very little or no discretion is used when approaching or choosing sexual partners.
3. The terms are often humorously applied when an individual is observed making, and/or later regretting, advances towards a partner that is deemed unattractive, unacceptably scandalous, or otherwise repulsive when sober. The "beer goggles" are considered to have distorted the "wearer's" vision, making unattractive people appear beautiful, or at least passably attractive.

وتسمى نظارة البيره واختلاف النظر ولخبطة النظر

وملخص ما تقدم ان بسبب الخمور قد يتغير نظر الرجل الى المرأة فيراها امراة جذابة جدا جنسيا حتى لو كانت على عكس ذلك او حتى لو كانت شخصه غير مرغوبه لديه

**ويؤكد ذلك ايضا موقع التوعية الصحية**

To address this knowledge gap, the present study investigated the influence of alcohol intoxication on men's and women's sexual risk-taking intentions on both the ascending and descending BAC limbs. Moreover, because extant research indicates that perceived intoxication and sexual arousal are not only subject to the biphasic effects of alcohol but are also related to sexual risk-taking intentions, we investigated the role of these two in-the-moment states in alcohol's limb-specific effects on unprotected sex intentions.

**ويوضح ان المخاطره في الجنس ( زيادة الرغبه الجنسيه بمخالفة القانون ) تزيد مع الخمور**

**[http://findarticles.com/p/articles/mi\\_hb6378/is\\_4\\_70/ai\\_n32169215/](http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6378/is_4_70/ai_n32169215/)**

**ولمن يريد المزيد فهذا بحث كامل عن تأثير الكحول على العمليات الجنسيّة**

**<http://dionysus.psych.wisc.edu/lit/Articles/GeorgeW2000a.pdf>**

**فالشيخ الذي يقول لم يسمع بها اقول له اقرأ اي كتاب علمي او فقط التاريخ الاسلامي وانت تسمع بها جيدا**

**وبخاصة اشخاص مثل الخطاب ابو عمر وحوادث القتل بسبب الخمور وغيرهم الكثرين ولكن هذا ليس**

**موضوعي الان**

**بـ النقطه الثانيه وهي ادعاء ان الخمر يفقد الرجل القدرة علي الجماع فهذا ايضا خطأ شديد بل العكس هو**

**الصحيح**

**Crowe LC, George WH (May 1989). "Alcohol and human sexuality: review and integration". *Psychol Bull* 105 (3): 374–86. doi:10.1037/0033-295X.105.3.374. PMID 2660179.**

**Alcohol is a depressant. After consumption, alcohol causes the body's systems to slow down. Often, feelings of drunkenness are associated with elation and happiness but other feelings of anger or depression can arise. Balance, judgment, and coordination are also negatively affected. One of the most significant side effects of alcohol is reduced inhibition. Reduced inhibitions can lead to an increase in sexual behavior.**<sup>[2]</sup>

فالكحول يبطئ العمليه الجنسيه ولكنها يزود الرغبه الجنسيه  
ويؤكد ذلك ايضا

**In American society, alcohol and sex are frequently linked, and commonly held beliefs about alcohol include that it increases sexual arousal, makes it easier to act on sexual feelings and enhances the quality of sexual experiences**

ومنحوظه ان الكحول الذي يؤدي الي فقد التمييز ليس هو نفس التركيز الذي يؤدي الي فقد الوعي  
**فانواع التركيزات المختلفه للكحول**

- 20–99 mg/dL - Impaired co-ordination and euphoria
- 100–199 mg/dL - Ataxia, poor judgement, labile mood
- 200–299 mg/dL - Marked ataxia, slurred speech, poor judgement, labile mood, nausea and vomiting
- 300–399 mg/dL - Stage 1 anaesthesia, memory lapse, labile mood
- 400+mg/dL - Respiratory failure, coma and death

فهو لو تعددت مستوي الكحول فوق 100 ملي جرام الى الديسيلىتر اي 100 ملي دم لا يميز بناته ولكنه يكون قادر على العمليه الجنسيه ولكن يحتاج ان يصل الكحول الى فوق 300 حتى يصل الى مرحلة التخدير التي في مرحله من مراحل التخدير ممكن يفقد القدرة علي الجماع

وشرح اكثر للمراحل

## مرحلة الهمباج (Euphoria) (BAC = 0.03 to 0.12%)

- Overall improvement in mood and possible euphoria
- Increased self-confidence
- Increased sociability
- Shortened attention span
- Flushed appearance
- Inhibited judgment
- Impaired fine muscle coordination

## مرحلة الفتور (Lethargy) (BAC = 0.09 to 0.25%)

- Sedation
- Impaired memory and comprehension
- Delayed reactions
- Ataxia; balance difficulty; unbalanced walk
- Blurred vision; other senses may be impaired

## مرحلة التشوش (Confusion) (BAC = 0.18 to 0.30%)

- Profound confusion
- Emotional lability
- Impaired senses
- Analgesia
- Increased ataxia; impaired speech; staggering
- Dizziness often associated with nausea ("the spins")
- Vomiting (emesis)

## مرحلة التخدير (BAC = 0.25 to 0.40%)

- Severe ataxia
- Lapses in and out of consciousness
- Unconsciousness
- Anterograde amnesia
- Vomiting (death may occur due to inhalation of vomit (pulmonary aspiration) while unconscious)
- Respiratory depression (potentially life-threatening)
- Decreased heart rate
- Urinary incontinence

## مرحلة الاغماء (BAC = 0.35 to 0.50%)

- Unconsciousness (coma)
- Depressed reflexes (i.e., pupils do not respond appropriately to changes in light)
- Marked and life-threatening respiratory depression
- Markedly decreased heart rate
- Most deaths from alcohol poisoning are caused by dosage levels in this range.

وفي المرحلة الثانية او الثالثة يكون قادر على العلاقة الجنسية بدون ان يحدد الذي معه

وايضا التخدير اربع مراحل وهي اولا فقد الوعي

ثـ تخدير الانسجه العضليه

**Skeletal muscles**

ثم بعدها تخدیر التسجه الناعمه

### **Smooth muscle**

ثم بعدها توقف التنفس والموت

- Stage 1: Stage 1 anaesthesia, also known as the "induction", is the period between the initial administration of the induction agents and loss of consciousness. During this stage, the patient progresses from analgesia without amnesia to analgesia with amnesia. Patients can carry on a conversation at this time.
- Stage 2: Stage 2 anaesthesia, also known as the "excitement stage", is the period following loss of consciousness and marked by excited and delirious activity. During this stage, respirations and heart rate may become irregular. In addition, there may be uncontrolled movements, vomiting, breath holding, and pupillary dilation. Since the combination of spastic movements, vomiting, and irregular respirations may lead to airway compromise, rapidly acting drugs are used to minimize time in this stage and reach stage 3 as fast as possible.
- Stage 3: Stage 3, "surgical anaesthesia". During this stage, the skeletal muscles relax, and the patient's breathing becomes regular. Eye movements slow, then stop, and surgery can begin. It has been divided into 4 planes:
  1. eyes initially rolling, then becoming fixed
  2. loss of corneal and laryngeal reflexes
  3. pupils dilate and loss of light reflex
  4. intercostal paralysis, shallow abdominal respiration, dilated pupils
- Stage 4: Stage 4 anaesthesia, also known as "overdose", is the stage where too much medication has been given relative to the amount of surgical

stimulation and the patient has severe brain stem or medullary depression. This results in a cessation of respiration and potential cardiovascular collapse. This stage is lethal without cardiovascular and respiratory support. This can be fatal.

ولهذا من يدعى ان المخمور الذي فقد التمييز لا يقدر على العملية الجنسية فهو لا يفهم شيئاً عن الانسجه  
ومراحل عمل الكحل وايضاً مراحل التخدير وهذا الامر الذي شرحت مختصره فقط

والمجد لله دائماً